

ELIMINA LA CANDIDIASIS Y TODOS SUS SÍNTOMAS*



**ALIVIO DESDE LA
PRIMERA APLICACIÓN²**



Picazón



Enrojecimiento



Ardor



Hinchazón



Flujo Grumoso



Dolor



*Síntomas como picazón, flujo grumoso y ardor.

¿Qué es gynoCanesten®?

Es un antimicótico vaginal de amplio espectro que elimina las infecciones vaginales por hongos.³

Su principio activo, **clotrimazol**, actúa inhibiendo la formación de la pared de los hongos con el fin de alterar su permeabilidad y así evitar su crecimiento y proliferación. **De esta manera, alivia la CVV* y sus síntomas desde la primera aplicación.**^{4,5}



GynoCanesten® crema y óvulos son dos formas galénicas diferentes, que funcionan para eliminar las infecciones vaginales causadas por hongos. Sin embargo, se deben conocer los beneficios de cada presentación.

Recomendaciones

- Efectuar la aplicación **por la noche y antes de irte a dormir.**
- Es conveniente **no realizar el tratamiento durante la menstruación.**
- Seguir las indicaciones del médico en situación de embarazo.
- **Evitar las relaciones sexuales durante el tratamiento** y hasta 48 horas después de haberlo terminado.



Dosis y Presentaciones

Óvulo blando 1 DÍA



Óvulo blando 3 DÍAS



Crema Vaginal 3 DÍAS



Única aplicación, facilita la adherencia del tratamiento

El producto actúa durante el tratamiento


CONTENIDO

1 Óvulo + aplicador

3 Óvulos

1 Tubo con Crema + 3 aplicadores

PRESENTACIÓN



APLICACIÓN

Interna (vaginal)

Interna (vaginal)

Interna (vaginal) y Externa (vulvar)

ÓVULO BLANDO 1 DÍA y 3 DÍAS

Funciona predominantemente para síntomas intravaginales con la promesa de valor de eliminar la candidiasis con una sola aplicación con el óvulo 1 día. Alivio de los síntomas desde la primera aplicación con el óvulo 3 días.

CREMA VAGINAL 3 DÍAS

Funciona en infecciones vaginales causadas por hongos aliviando los síntomas intravaginales y **los síntomas incómodos de predominio vulvar (externo)**. Alivio de los síntomas desde la primera aplicación.



gyno**Canesten**[®]

GYNOCANESTEN[®] OVULOS BLANDOS 500mg. POSOLOGÍA: 1 aplicación de un óvulo al día.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Consulta a tu médico si eres menor de 16 o mayor de 65 años; si nunca has tenido relaciones sexuales; si eres diabética; en periodo de lactancia; si observas cualquier otra reacción adversa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad en el embarazo o cuando se supone su existencia. No usar en afecciones hepáticas y en asociaciones con Nelfinavir. Reg. San. No. 6077-MEE-0321.

GYNOCANESTEN[®] OVULOS BLANDOS 200mg. FORMA FARMACÉUTICA: óvulos blandos. INDICACIÓN:

Antimicótico de Uso vaginal. POSOLOGÍA: 1 óvulo blando al día durante 3 días. **PRECAUCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS:** consulta a tu médico si eres menor de 16 o mayor de 65 años; si nunca has tenido relaciones sexuales; si eres diabética; en periodo de lactancia; si observas cualquier otra reacción adversa, si los síntomas persisten, consulte a su médico. **CONTRAINDICACIONES:** alergia al ingrediente activo clotrimazol y/o cualquiera de los componentes de la fórmula del producto, contraindicado en el embarazo o cuando se supone de su existencia. No usar en afecciones hepáticas y en asociaciones con Nelfinavir. Reg. San.: 29643-02-11.

GYNOCANESTEN 2% CREMA VAGINAL. FORMA FARMACÉUTICA: crema. INDICACIÓN: Antimicótico de Uso vaginal. POSOLOGÍA: 1 aplicación diaria durante 3 días. **PRECAUCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS:** consulta tu médico si eres menor de 16 o mayor de 65 años; si nunca has tenido relaciones sexuales; si eres diabética; en periodo de lactancia; o si observas cualquier otra reacción adversa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico, **CONTRAINDICACIONES:** alergia al ingrediente activo clotrimazol y/o cualquiera de los componentes de la fórmula. Contraindicado en el embarazo o cuando se supone su existencia. No usar en afecciones hepáticas y en asociaciones con nelfinavir. Reg. San.: 361860912.