



APRONAX®



**PONLE
UN ALTO
AL DOLOR
FUERTE**

HASTA
24:00 HORAS*

*Aplica para Apronax® PRO



CON EL PORTAFOLIO DE **APRONAX**

¡LA VIDA SIGUE, EL DOLOR NO!

ES LA OPCIÓN DURADERA Y RÁPIDA PARA EL ALIVIO DE MÚLTIPLES DOLORES FUERTES.



DURACIÓN:

Gracias a su fórmula con tecnología bicapa, actúa desde los primeros 15 minutos para un alivio rápido y prolongado de múltiples dolores fuertes hasta por 24 horas. **Comodidad duradera una vez al día.**



HASTA
24:00 HORAS



RAPIDEZ:

Gracias a su cápsula líquida, alivia rápidamente dolores fuertes hasta por 12 horas.



HASTA
12:00 HORAS



POTENCIA:

Gracias a su fórmula de alta concentración, brinda un potente alivio de múltiples dolores hasta por 12 horas.



MEDICAMENTO Rx

HASTA
12:00 HORAS



ACCIÓN LOCAL:

En presentación de gel de fácil aplicación para la inflamación y el dolor localizado. **Acción local**



A NECESIDAD

*Seguir indicaciones médicas.

MARCA



Marca #1 TOM*
Recordación espontánea

***Top of Mind en consumidor**

Fuente: BHT Kantar / IQVA a Nov'23
analgésicos adultos orales.



APRONAX[®] PRO

LA REVOLUCIÓN DE LA CATEGORÍA
PRIMER ANALGÉSICO OTC* QUE OFRECE
HASTA **24:00 HORAS*** DE ALIVIO CON
1 SOLA TABLETA



ALIVIO SOSTENIDO
HASTA POR
24
HORAS!

ALIVIO
RÁPIDO
A PARTIR DE
15
MINUTOS!



ACCIÓN RÁPIDA CAPA EXTERIOR DE LIBERACIÓN INMEDIATA

Proporcionando un efecto analgésico antiinflamatorio desde los primeros 15 minutos de administración.¹



COMODIDAD POSOLÓGICA
PARA EL PACIENTE.²



BUEN PERFÍL DE SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD
Similar o mejor que otros AINE, incluyendo mayor seguridad cardiovascular y gastrointestinal.^{3,4}


PERMITE AL PACIENTE ESTAR ACTIVO EN EL DÍA Y DESCANSAR EN LA NOCHE.^{1,2}

PRECIO CONVENIENTE CON LA
COMODIDAD DE 1 TOMA AL DÍA

CON **APRONAX**
¡LA VIDA SIGUE, EL DOLOR NO!

¿POR QUÉ APRONAX® PRO ES UNA BUENA SOLUCIÓN PARA EL MANEJO DEL DOLOR?

El único producto OTC que ofrece un **alivio rápido y prolongado hasta por 24 horas con una sola tableta.**



*Precios: páginas web de los clientes de Ecuador.
 Los precios son de referencia y pueden variar según el punto de venta.

PRINCIPALES ATRIBUTOS



#1
ALIVIO RÁPIDO



#2
ALIVIO PROLONGADO



#3
EFICACIA



#4
BUEN PERFIL DE SEGURIDAD



Apronax®, Naproxeno sódico 550 mg. FORMA FARMACÉUTICA: tabletas recubiertas. **INDICACIÓN:** Para el tratamiento de condiciones de dolor tales como dolor muscular y dolor en el cuerpo, dolor de espalda, cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor de muela y extracciones dentales, dolor asociado con resfriado común y gripa o cirugía menor, artritis menor y dolor reumático y dolor después del trauma. Además, está indicado para el alivio de la inflamación, alivio de rigidez y para la reducción de fiebre. **POSOLOGÍA:** Conforme a la prescripción médica. Los efectos indeseados se pueden minimizar al usar la dosis mínima efectiva para la menor duración necesaria para controlar los síntomas. El naproxeno sódico no se debe tomar por más de 10 días, a no ser que el médico lo prescriba de otro modo. **Si el dolor o la fiebre persisten o si cambian los síntomas, es necesario consultar a un médico.** **PRECAUCIONES:** Se debe evitar el uso de naproxeno sódico/naproxeno, concomitante con AINES, incluyendo inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Los efectos indeseables pueden ser minimizados al usar la dosis efectiva más baja para la menor duración necesaria para controlar los síntomas. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad conocida al naproxeno o a cualquier otro ingrediente en el producto medicinal. Historia de asma, urticaria o reacciones de tipo alérgico después de tomar aspirina u otro medicamento no esteroide antiinflamatorio (AINES). Historia de sangrado gastrointestinal o perforación relacionada con una terapia previa de AINES. Úlcera péptica activa o una historia de úlcera péptica recurrente o hemorragia (dos o más episodios distintos de ulceración probada o sangrado). Insuficiencia cardíaca severa. Contraindicado en el tercer trimestre del embarazo. **Reg. San.: 881-MEN-0616. Medicamento Rx.**

APRONAX® GEL. FORMA FARMACÉUTICA: Gel. **INDICACIÓN:** Varias condiciones caracterizadas por dolor e inflamación. Para el tratamiento de dolor muscular y traumatismos de tejidos blandos, como esguinces, torceduras, golpes, desgarros y lesiones deportivas, bursitis, tendinitis, epicondilitis, sinovitis y osteoartritis de articulaciones superficiales como de los dedos y las rodillas. Para la inflamación y dolor que ocurre en padecimientos de cuello y espalda como lumbalgia, dorsalgia, y torticulis. Para el dolor artrítico y reumático, el gel tiene acción contra la inflamación. **POSOLOGÍA:** Usar 2 – 3 veces al día sobre el área afectada. **PRECAUCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS:** Aplicar en superficies con ausencia de heridas y lesiones abiertas. Evitar todo contacto con los ojos y mucosas. **Si los síntomas persisten, consulte a su médico.** **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad al naproxeno o al naproxeno sódico. No debe aplicarse en áreas extensas ni por períodos prolongados. En paciente con ataques de asma, urticaria o rinitis precipitados por ácido acetilsalicílico u otros agentes antiinflamatorios no esteroideos. **Reg. San.: 36319112.**

APRONAX® LIQUID GELS. FORMA FARMACÉUTICA: Cápsula blanda. **INDICACIÓN:** Para el tratamiento de condiciones de dolor tales como dolor muscular y dolor en el cuerpo, dolor de espalda, cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor de muela y extracciones dentales, dolor asociado con resfriado común y gripa o cirugía menor, artritis menor y dolor reumático y dolor después del trauma. Además, está indicado para el alivio de la inflamación, alivio de rigidez y para la reducción de fiebre. **POSOLOGÍA:** Adultos 1 cápsula blanda cada 6-8-12 horas. No se debe tomar por más de 10 días, a no ser que el médico lo prescriba. **PRECAUCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS:** El dolor de origen gastrointestinal no es una indicación para el naproxeno sódico/ naproxeno. **Si los síntomas persisten, consulte a su médico.** **CONTRAINDICACIONES:** Niños menores de 12 años. Hipersensibilidad conocida al naproxeno o a cualquier otro ingrediente. Historia de asma, urticaria o reacciones de tipo alérgico después de tomar ácido acetilsalicílico u otro (AINES). Sangrado gastrointestinal o perforación relacionada con uso de AINES. Úlcera péptica activa o recurrente. Insuficiencia cardíaca severa. Contraindicado en el tercer trimestre del embarazo. **Reg. San.: H7311013.**

Apronax® PRO. FORMA FARMACÉUTICA: Tableta de liberación modificada. **INDICACIÓN:** Analgésico y Antipirético. Para el tratamiento del dolor como: dolor muscular y dolor corporal, dolor de espalda, dolor menstrual, dolor de muela y extracciones dentales, dolor asociado con resfriado común y gripa o cirugía menor, artritis menor y dolor reumático y dolor después del trauma. Además, está indicado para el alivio de la inflamación, alivio de rigidez y para la reducción de fiebre. **POSOLOGÍA:** Adultos y adolescentes de 12 años o más: Tomar 1 comprimido cada 24 horas mientras duren los síntomas por no más de 10 días, a menos que lo indique su médico. La máxima dosis diaria de naproxeno base equivalente no debe sobrepasar 603 mg (equivalente a 660 mg de naproxeno sódico). **PRECAUCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS:** El dolor de origen gastrointestinal no es una indicación para el naproxeno sódico. Se debe evitar el uso de naproxeno sódico, concomitante con AINES, incluso COX-2 selectivo. **Si los síntomas persisten, consulte a su médico.** **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad conocida al naproxeno o a cualquier otro ingrediente. Historia de asma, urticaria o reacciones de tipo alérgico después de tomar AINES. Historia de sangrado gastrointestinal, úlcera o perforación relacionada con una terapia previa de AINES. Insuficiencia cardíaca severa. Contraindicado en el tercer trimestre del embarazo. **Reg. San.: 7413-MEE-0822. *Respaldado por el registro sanitario / *primer naproxeno (apronax) con tecnología bicapa en Ecuador.**