




PARA UN GRAN DOLOR DE CABEZA, UN GRAN Y RÁPIDO ALIVIO*

Efecto analgésico
de **Aspirina®**
(Ácido acetilsalicílico)



Potencia de
la **CAFEÍNA**

NUEVA



***20 MINUTOS**



CAFIASPIRINA[®] FORTE




Es la combinación de **Aspirina más el poder de la cafeína** que incrementa el efecto analgésico, aliviando rápida y efectivamente los fuertes dolores de cabeza.

Efecto analgésico de **Aspirina[®]**

Ácido Acetilsalicílico
tabletas 650mg


Analgésico y antipirético.
Alivio sintomático
de fuertes dolores de cabeza.



Potencia de la **CAFEÍNA**

Cafeína 65mg

Incrementa el efecto
analgésico y favorece
la absorción del
medicamento.



NUEVA



BENEFICIOS

¡Alivio rápido y efectivo!



Para **dolores fuertes de cabeza y generados por estrés.**



Poder analgésico gracias a su combinación con cafeína que aumenta su rapidez y efectividad.



Rapidez de acción: Comienza a actuar **en minutos** dada su rápida absorción.*

DOSIS: Niños mayores de 12 años y Adultos 1 tableta cada 4 a 8 horas. No exceder 6 tabletas por día.

*20 Minutos

VENTAJAS



Seguridad a nivel estomacal

El perfil de seguridad del fármaco es favorable: Las molestias gastrointestinales son generalmente de intensidad leve y con una incidencia comparable a la del ibuprofeno y el paracetamol.¹



Seguridad a nivel cardiovascular

La Aspirina es el único AINE que no se asocia a riesgo cardiovascular y cuyos efectos sobre la funcionalidad renal son mínimos.¹



Comodidad Posológica

Efecto prolongado que permite menos dosificación diaria al inhibir de forma sostenida la COX.²



Según las directrices internacionales, la aspirina puede considerarse una terapia de **primera línea** para el tratamiento del dolor de cabeza.¹



LEGALES

Material exclusivo para profesionales de la salud. Prohibida su reproducción o distribución por parte de personal ajeno a Bayer.

CAFIASPIRINA FORTE tabletas. Dosis: Adultos y niños de 12 años o mayores: Tome 1 tableta cada 4 a 8 horas. Puede tomar como máximo 6 tabletas por día (24 h). Advertencias y precauciones: No usar en personas alérgicas o sensibles al ácido acetilsalicílico u otros AINEs; menores de 12 años, embarazadas, lactantes, polimedicados y/o ancianos. Evitar usar con otros AINEs, anticoagulantes, antes o después de cirugía o con alcohol. Historia de úlceras, sangrado o perforación gastrointestinal; pacientes con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, o discracias sanguíneas. Reg. San.: EE-02166. Bayer S.A – RUC 20100096341. CH-20250305-93.