

**NUEVO**

**APRONAX<sup>®</sup>**  
**PRO**

**LA REVOLUCIÓN DE  
LA CATEGORÍA**

**TECNOLOGÍA BI-CAPA PARA UN  
ALIVIO RÁPIDO Y PROLONGADO DEL DOLOR<sup>1</sup>**



**PRIMER ANALGÉSICO  
QUE OFRECE HASTA**

**24:00 HORAS**

**DE ALIVIO CON**

**1 SOLA TABLETA**

**MEDICAMENTO RX**


## RÁPIDEZ

ACCIÓN RÁPIDA GRACIAS A SU CAPA EXTERIOR DE LIBERACIÓN INMEDIATA.

EL **40% DE LA DOSIS** SE LIBERA EN LOS **PRIMEROS 15 MINUTOS**<sup>1</sup>

## EFECTO PROLONGADO



SU CAPA INTERIOR DE LIBERACIÓN MODIFICADA LIBERA EL **60% DE LA DOSIS**, PROPORCIONANDO EFICACIA HASTA POR **24 HORAS**<sup>1</sup>



**MEDICAMENTO RX**


# DURACIÓN HASTA LA SIGUIENTE DOSIS<sup>3,4</sup>

Se ha demostrado clínicamente que **NAPROXENO** alivia el dolor asociado con:



## EFICACIA COMPROBADA

ALIVIO MÁS PROLONGADO EN COMPARACIÓN CON PARACETAMOL E IBUPROFENO<sup>3,4</sup>



# CON **APRONAX**<sup>®</sup>


## ¡LA VIDA SIGUE, EL DOLOR NO!

Es la opción **duradera y rápida** para el alivio de múltiples dolores fuertes.  
**¡UNO PARA CADA NECESIDAD!**

POSOLÓGIA

APRONAX<sup>®</sup> 550 mg  
 Una tableta cada 12 horas

Potencia para dolores que se consideran aún más fuertes



ALIVIO HASTA:  
**12:00 HORAS**  
 Medicamento Rx

APRONAX<sup>®</sup> 660 mg TECNOLOGÍA BI CAPA PARA UN ALIVIO RÁPIDO Y PROLOGADO DEL DOLOR  
 Una tableta al día  
 Alivio prolongado

**NUEVO**



**24:00 HORAS**  
 Medicamento Rx

APRONAX<sup>®</sup> 275 mg  
 Una tableta cada 12 horas

Rápido y efectivo alivio para dolores fuertes



**12:00 HORAS**

Ficha técnica



Ficha técnica



# APRONAX® PRO



**NUEVO**

## APRONAX® PRO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL DOLOR<sup>5,6</sup>

Tecnología BI-CAPA que permite:



**Rápidez**



**Efecto prolongado**



**Eficacia**










**Seguridad**

Una toma de Apronax® Pro brinda un **alivio eficaz y constante del dolor, permitiendo a los pacientes permanecer activos durante el día y descansar en la noche**<sup>1,2</sup>



**APRONAX.**

	<b>NAPROXENO SÓDICO</b>	<b>PARACETAMOL 500mg CAFEÍNA 65mg</b>	<b>DICLOFENACO SÓDICO 50 mg</b>	<b>PARACETAMOL 1g</b>	<b>DICLOFENACO 50mg PARACETAMOL 500mg</b>
	<b>EFICACIA</b> 12:00 HORAS	<b>2 TABLETAS</b> CADA 6 HORAS	<b>1 TABLETA</b> CADA 8 HORAS	<b>1 TABLETA</b> CADA 6 HORAS	<b>1 TABLETA</b> CADA 6 HORAS
	<b>MAYOR POTENCIA</b> 12:00 HORAS				
	<b>ALIVIO RÁPIDO Y PROLONGADO</b> 24:00 HORAS	<b>Precio día S./9,6</b>	<b>Precio día S./10,5</b>	<b>Precio día S./8</b>	<b>Precio día S./6</b>
	<b>Precio día S./3,60</b>				
	<b>Precio día S./3,80</b>				
	<b>Precio día S./2,50*</b>				

**¡COMODIDAD POSOLÓGICA Y PRECIO CONVENIENTE!\***

OBSERVATORIO DE PRECIOS de Perú en <https://opm-digemid.minsa.gob.pe/#/consulta-producto> \*Excepto para Apronax Pro, producto en lanzamiento. Los precios son de referencia y pueden variar según el punto de venta.



**APRONAX® 275 mg Tableta Recubierta.** Reg. San. EN-07423. Dosis: Adultos: 1 tableta 275 mg cada 8-12 horas. Advertencias y precauciones: No usar en personas alérgicas al naproxeno u otros AINEs, menores de 12 años, embarazo, lactancia, poli-medicados y ancianos. Evitar usar con otros AINEs o alcohol; historia de úlceras, sangrado o perforación gastrointestinal; pacientes con diátesis, insuficiencia cardiaca, renal o hepática. Bayer S.A – RUC 20100096341 APRONAX® 550 mg Tableta Recubierta. Reg. San. EN-01992. Dosis: 1 tableta cada 24 horas . Se puede incrementar gradualmente la dosis hasta 1100 mg diarios Advertencias y precauciones: No usar en personas alérgicas al naproxeno u otros AINEs, menores de 12 años, embarazo, lactancia, poli-medicados y ancianos. Evitar usar con otros AINEs o alcohol; historia de úlceras, sangrado o perforación gastrointestinal; pacientes con diátesis, insuficiencia cardiaca, renal o hepática. Bayer S.A – RUC 20100096341.

**APRONAX® PRO.** Naproxeno sódico 660 mg. Registro. 7413-MEE-0822. Tableta de liberación modificada. Posología: Adultos y adolescentes de 12 años o más: Tomar 1 comprimido cada 24 horas mientras duren los síntomas por no más de 10 días, a menos que lo indique su médico. La máxima dosis diaria de naproxeno base equivalente no debe sobrepasar 603 mg (equivalente a 660 mg de naproxeno sódico). Precauciones de uso y advertencias: El dolor de origen gastrointestinal no es una indicación para el naproxeno sódico. Se debe evitar el uso de naproxeno sódico, concomitante con AINEs, incluso COX-2 selectivo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hipersensibilidad conocida al naproxeno o a cualquier otro ingrediente. Historia de asma, urticaria o reacciones de tipo alérgico después de tomar AINES. Historia de sangrado gastrointestinal, úlcera o perforación relacionada con una terapia previa de AINES. Insuficiencia cardíaca severa. Contraindicado en el tercer trimestre del embarazo. Bayer S.A – RUC 20100096341. “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 numeral 39.2 de la ley No. 32033 puede informarse, respecto del precio de venta disponible al consumidor consultando el OBSERVATORIO PRECIOS de Perú en OPM | Bienvenido ([minsagob.pe](http://minsagob.pe)) ; y respecto a la calidad consultando el OBSERVATORIO DE CALIDAD en - Mi aplicación ASP.NET ([minsagob.pe](http://minsagob.pe)).”